

TRABAJO PARA EL PRIMER CORTE
Cálculo I (Funciones Reales)
Programa de Ing. Agrícola
Prof. Juan Deavila

Observación: Se debe presentar el día 12 de Marzo. Se debe trabajar en grupos de mínimo 4 estudiantes y máximo 6 estudiantes. Recuerde que la calificación de este trabajo representa el 30 % de la nota final para el primer corte.

Definición de función y funciones reales

1. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 7, 9\}$. Determine cuales de los siguientes conjuntos representan la gráfica de una función real $f: A \rightarrow B$.

a) $\{(1, 4), (3, 9), (2, 7)\}$

d) $\{(1, 9), (2, 4)\}$

b) $\{(1, 7), (3, 4), (1, 9)\}$

e) $\{(3, 7), (2, 9), (1, 4), (3, 9)\}$


c) $\{(3, 7), (2, 4), (1, 9)\}$

f) $\{(1, 7), (3, 7), (2, 7)\}$

2. La gráfica de cierta función es el conjunto $\{(2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 1)\}$. Determine el dominio y el rango de dicha función. Además, represente la gráfica de dicha función en el plano cartesiano.
3. Sea f la función definida para todo $x \in \mathbb{R}$ por $f(x) = x + 1$. Calcular $f(2)$, $f(-2)$, $-f(2)$, $f(\frac{1}{2})$, $1/f(2)$ y para $a, b \in \mathbb{R}$, calcular $f(a + b)$, $f(a) + f(b)$, $f(a)f(b)$ y $f(ab)$.
4. Sea f la función definida para todo $x \in \mathbb{R}$ por $f(x) = |x - 3| + |x - 1|$. Calcular: $f(0)$, $f(2)$ y $f(-2)$. Determinar los valores reales que puede tomar t para que se cumpla la igualdad $f(t + 2) = f(t)$.
5. Sea f la función definida como sigue: $f(x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$; $f(x) = 2$ para todo $x \in (1, 2]$. Es decir, f es la función definida por partes de la siguiente forma:


$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1] \\ 2 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

- a) Determine el dominio de f .
- b) Trazar la gráfica de la función f .
- c) Sea g la función definida por $g(x) = f(2x)$. Determinar el dominio de g y dibujar su gráfica.
- d) Sea h la función definida por $h(x) = f(x - 2)$. Determinar el dominio de h y dibujar su gráfica.
- e) Sea k la función definida por $k(x) = f(2x) + f(x - 2)$. Determinar el dominio de h y dibujar su gráfica.
6. Sean f y g funciones polinomiales definidas por $f(x) = x$ y $g(x) = x^3$. Las gráficas de estas dos funciones se cortan en tres puntos. Dibujar una parte suficiente de sus gráficas para ver cómo se cortan.
7. Sea f la función definida por partes de la siguiente forma:
- a) Establezca el valor de $f(1)$
- b) Estime el valor de $f(-1)$
- c) ¿Para que valores de x se tiene que $f(x) = 1$?
- d) estime los valores de x para los que $f(x) = 0$
- e) Establezca el dominio y el rango de f .
- f) ¿En qué intervalo f es creciente?
- g) ¿En qué intervalo f es decreciente?







8. Se proporcionan las gráficas de las funciones f y g .

- Establezca los valores de $f(-4)$ y $g(3)$.
- ¿Para que valores de x se tiene que $f(x) = g(x)$?
- estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$
- Establezca el dominio y el rango de f .
- Establezca el dominio y el rango de g .
- ¿En qué intervalo f es decreciente?
- ¿En qué intervalo g es decreciente?



9. Determine si la curva dada en cada plano cartesiano representa la gráfica de una función. Si lo es, dé el dominio y el rango de la función.



- Sea f la función definida para todo $x \in \mathbb{R}$ por $f(x) = x - x^2$. Determine $f(2+h)$, $f(x+h)$ y $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ donde $h \in \mathbb{R}$.
- Sea f la función definida para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ por $f(x) = \frac{x}{x+1}$. Determine $f(2+h)$, $f(x+h)$ y $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ donde $h \in \mathbb{R}$.
- Encuentre el dominio de la función f definida por:

a) $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$

b) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+x-6}$

c) $f(x) = \sqrt{x-1}$

$$d) f(x) = \sqrt{4-x^2}$$

$$e) f(x) = |x| + x$$

$$f) f(x) = \frac{x}{|x|}$$

$$g) f(x) = \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

$$h) f(x) = \sqrt{|x^3|}$$

13. Utilice una tabla de valores para dibujar la gráfica de la función y determine su dominio y su rango.

$$a) f(x) = 3x - 1$$

$$b) f(x) = 5 - x^2$$

$$c) f(x) = \sqrt{x-1}$$

$$d) f(x) = \sqrt{x^2-4}$$

$$e) f(z) = |3z + 2|$$

$$f) f(x) = \frac{x^2 - 25}{x + 5}$$

$$g) f(x) = \frac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$$

$$h) \phi(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq 3 \\ 2 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

$$i) H(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 6x + 10 & \text{si } 2 < x < 5 \\ 4x - 15 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

$$j) g(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$k) G(t) = \lfloor t - 4 \rfloor$$

14. La función U definida por

$$U(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

es llamada función escalón (o salto) unitario. Defina las funciones F, G y H por $F(x) = U(x - 1)$, $G(x) = U(x) - 1$ y $H(x) = U(x) - U(x - 1)$ respectivamente y dibuje sus gráficas.

15. Considerando la función escalon unitario, defina las funciones F, G y H por $F(x) = x \cdot U(x)$, $G(x) = (x + 1) \cdot U(x)$ y $H(x) = (x + 1) \cdot U(x + 1) - x \cdot U(x)$ respectivamente y dibuje sus gráficas.

16. Usando la gráfica de la función f definida por $f(x) = \sqrt{x}$. Realizar las gráficas de las funciones g, h, q, r y s definidas por:

$$a) g(x) = \sqrt{x} + 2$$

$$b) h(x) = -\sqrt{x}$$

$$c) q(x) = \sqrt{x-2}$$

$$d) r(x) = \sqrt{x+3}$$

$$e) s(x) = \sqrt{2x}$$

$$f) g(x) = 2 - \sqrt{x-3}$$

17. Dadas las funciones f, g y h definidas por $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 1$ y $h(x) = x$ respectivamente. Determinar:

$$a) f(g(1))$$

$$e) f(h(4))$$

$$i) g \circ h$$

$$b) g(f(1))$$

$$f) f(g(h(1)))$$

$$j) f \circ f$$

$$c) g(f(0))$$

$$g) f \circ g$$

$$k) h \circ f$$

$$d) f(g(-4))$$

$$h) g \circ f$$

$$l) f \circ h \circ g$$

18. En un estanque en calma, se deja caer un objeto produciendo ondas en forma de círculos concéntricos. El radio (en pies) de la onda externa viene dado por la función r definida por $r(t) = 0,6t$, donde t es el tiempo en segundos transcurrido desde que el objeto toca el agua. El área del círculo viene dado por la función A definida por $A(r) = \pi r^2$. Determinar la función $A \circ r$. Determinar e interpretar el valor $(A \circ r)(5)$.

19. Determinar si la función q definida por $q(x) = 4x - x^2$ es par o impar o ninguna de estas.

Límites y continuidad de funciones reales

20. Determinar los siguientes límites:

$a)$

Continuará....

! Éxitos...¡